

증상	병명	치료
심한 가려움증, 양팔 등에는 간에 병이 있는 사람에게 나타나는 간 반이 몹시 심함.	가려움(만성간염으로 심한 가려움)	cm 태충,기문,간유,축빈,폐유,견우,혈해, 중완,양문
가려운것이 특징인데 굵은 자리에 피딱지가 생기고 2차적으로 표피가 벗겨지며 피부염,농피증이 겹칠수 있으며, 가려움으로 불면증이 온다.	가려움증(피부소양증)	tm 습진에 준하여 전신적인 치료 한다 습진과 같이 전신치료하고 처음 가려운 자리에 뜸한다. , 견우,비유,신유,대장유,축빈 + 무극 cm 견우 15분유침, 특효혈(조금깊게 유침) 혈해,축빈도 유효
	각막실질염	삼리,곡지,중완, 백회,대추,폐유,고황,간유,각손,
폐,비,신의 기능장애로볼수있다 각혈이란? 폐 or기도로부터 피가 나오는 상태 ==>극문은 지혈에 효과	각혈	격유,영대,거궐,무극 + 극문에 다장구 **출혈이 심한 경우 추가 : 극문 , 공최,백회도 중요한 지혈 위치이다
식욕부진,빨리 피로,변비에 고창과 빈혈 증상 동반	간 위축	간유,담유,비유,신유,곡지, 삼리,중완,거궐,우불용,우양문
소화장애,식욕감퇴,메스꺼움,상복통 또는 우협통,헛배부르기,두통,출혈등이있다. 간종대 또는 간위축,비대상기에는 황달,복수,빈혈,부종,심한경우 간성혼수등이 나타난다.	간경변증	tm 肩井,,지양,간유,담유,신유,거궐, 우불용,우기문 , 우양문, 삼리,곡지,고황,중완,관원 5장씩 , * 대돈에 3장씩 뜸한다.
트림,신물,배가 끓고 변이 고르지 못하고,변비가 생김, 안면은 검푸르고 황색이 됨	간경화	삼리,곡지,관원,중완,고황, 견정,지양,간유,담유,신유,거궐,우불용,우기문,우양문, 태도
간이 안좋을때	간경화, 간이안좋을때	거궐,좌우양문
간경화의 초기증세	간비대증	관원,삼리,곡지,중완, 지양,간유,담유,신유,거궐,우불용, 우양문
오른쪽 옆구리에 통증 일반적으로 특징적인 자각증상은없고,간이 커져서 딱딱하게 만져지고 압통있다. 식욕감퇴,피로감,소화장애,구토,간부위의불쾌감 및 둔한 통증이있음 수면장애,피로,황달,빈혈,부종	간염(만성)	tm 격유,간유,담유,거궐,우불용,우양문,우기문 , 삼리,곡지,중완
단순부분성발작:의식장애가없이 몸의 한 부분에서 일어나는 발작 복잡부분성발작:의식장애겸치며 발작이있고,몽롱상태,자동증 , 자신의 의지나 생각은 전혀없이 시키는데로따라함 전반성발작:의식장애와함께경련있음 진성전간(반복성떨는것) 반사성전간:지작자극이 원인이 되어 발작	간질(전간)	tm 천주,풍지,천료,신주,심유,지양,간유,신유, 잔중, 삼리,곡지,백회,고황,중완,기해,관원 cm 발작시 후기에 유침하면 증상의 호전이 있다 *.뇌에 외상을 입어 전간이 온 경우는 다친부위를 찾아 뜸하면 치료 효과가 높다.
주요증상:콧물,코막힘,재채기,목안아픔,목쉰소리,발열,두통과요통,전신권태감등 , 정기가 허해진 틈을타서 외감 육음의 사기가 폐에침입하여	감기	tm 먼저 풍문에 다장구 그래도 안떨어지면 삼리,곡지,중완,폐유 에 뜸 열이 심할때: 대추, 풍문 에 9~15장 정도 다장구 대추에만,또는 풍문에만 다장구해도 열이 내려가지 만,대추와풍문에 다장구 하기도 한다. cm 어제 (콧물)
열이 39도가 넘고 기침에 콧물, 두통으로 누움	감기 몸살	tm 풍문, 폐유 cm 대추,전완,외과,현종, 천돌,염천
	감기 몸살	외관(사), 현종(보) 영수보사법
감기로 열이 심하게 난다	감기(고열감기)	사혈한다(응급조치) , 어제,소택,삼상,인중심,이침
몸에 오한이 들고 떨리며 열이 나고 사지가 쭈신다	감기(급성감기)	사혈한다(응급조치) , 삼상(소상포함 왼쪽) , 상양,이침, 인중심(가운데 손가락의 둘째 마디와 세째마디의 가운데선)
한기가 느껴지고 가벼운 열이나며 목이 아프고 목소리가 잠겨 말하기 힘들다	감기(목감기)	사혈한다(응급조치) , 소상,상양,여태
한기가 느껴지고 가벼운 열이나며 코가 꽉 막혀 말을 하거나 숨을 쉬기 힘들다.	감기(코감기)	사혈한다(응급조치) , 소상,지음,상양,이침
, 원인불명, 여성에 많고 20대에 많다. , ※ 감상선종, 안구돌출, 맥박증가 (빈맥)	갑상선 기능항진	간유,신유,삼음교,중극,수도,음교,잔중,천돌, 무극
갑자기 기절하여 인사불성	갑자기 사지가 뻗뻗해질 때 = 시궐	응급조치(사혈) , 은백,용천,여태,소상,신문

<p>갱년기란? 월경이 끝나는 폐경을말함. 난소의 활동이 좋지않아서 월경이 불순해지고 늦어진다. 임신도 어렵고 된다해도 유산 되거나 조산하기 쉽다. 전신증상으로 어깨가 굳어지고 머리가 아픈증상이 나타난다 약피의해라 두어달이후</p>	갱년기장애	tm 천료, 간유, 신유, 천추, 무극
<p>손목: 손목움직이면 시린기가있고 오래되면 양지혈 부위에 뼈와, 흡사한 완두콩알 크기의 혹 같은것 생김. 엄지손가락:많이사용하면 태연,양계,열결까지 붓고 아프며, 직이면 주행에 따라 아픔 느낀다. 아킬레스건 :</p>	움 건초염	<p>엄지손가락쪽 : 대추,견우,곡지,양계,대연,경거,열결 제일아픈곳은 30장정도 다장구 혹이있으면 혹위에 다장구 아킬레스건쪽 : 신유,양관,삼리,승산,곤륜,신맥,태계</p>
<p>생손알이=표저 상처에 화농균 감염. ※ 생손알이</p>	건초염 표저(생인손,생손 알이)	<p>손가락 : 곡지,아픈손가락끝에서 첫번째 마디 , 황문의 양쪽 끝 발가락 : 삼리,아픈 발가락 발톱뿌리에서 , 2~3mm떨어진곳 손이면 曲池에 다장하고 아픈 손가락의 끝에서 첫번 째 마디 황문의 양끝에 밀립대로 5장씩 뜬다. 발이면三里에 다장하고 아픈 발가락의 발톱뿌리 에서 左右로 약간 뒤에 5장씩 뜬다. 가령 엄지면 大敦과 隱白정도를 뜬다.</p>
팔이 올라가지 않고, 돌아가지 않음	견비통(오십견)	<p>tm 무극보양 cm 대추,견정,천추,비누,견우,화도침</p>
<p>나이가 많아 간,신과 기혈이 허해서 근골을 영양 못한데다 외상,풍 한습사를 받아 근맥이 통하지 않고 기혈이 멎쳐 통증이 있다. 중년이 지난 사람이 약간 힘든일을하거나 어디에 살짝 부딪치거나 또는 아무원인 없이 어깨에 통증이 생기고 목이나 등으로 팔이 안 움직이게 된다. 이러한 견비통이다.</p>	견비통(오십견,견관절주 위염)	<p>tm 고향,천중,천료,견정,견우,전견우,곡지 cm 견우(환도),전견우(환도),양능천,현중,곡지,외관</p>
<p>세균감염으로 생기는 결막의 급성 염증성 질병,전염력강함 결락충혈,눈곱 눈이 까맣하고 눈이 부시며 눈물과 가려움이 있다.</p>	결막염	천주,풍지,백회,화료,각손,대추,간유,곡지,삼리,중완
<p>소변시 통증,방뇨 출혈,오줌이 자주 마렵고,오줌줄기가 끊어짐</p>	결석(방광)	삼리,곡지,중완,천추,기해,수도,중극,신유,방광유,삼음 교,경문,경골
요관의 통증,허리통증,피오줌 등	결석(신장)	삼초유,신유,방광유,양관,경문,대맥,경골,혈해,천추,수 도,중극,기해
<p>신장부위의 선통발작과 둔한요통,혈뇨,배뇨장애,작은결석이 오줌으 로 나가는것 등의 증상이 있다. 신장선통발작시 급성복통때와같이 자세바꾸려하고,서혜부와 다리 안쪽으로 뻗치는듯한 아픔을 호소</p>	결석(요로결석)	<p>tm 신유,방광유,중극,수도,천추,기해,경골,경문 , 신장결석이면: 대맥,삼초유,양관,혈해 , 방광결석이면 : 곡지,삼음교,삼리,중완 cm 조해,수도,삼음교,음릉천 , 작은결석은</p>
	고신경통	신유,대장유,환도,복토,혈해,곡천,양능천,삼음교
<p>복부가 가스로 인해 팽만하여 있는 상태,복부불쾌감,팽만감 가스가 나오면 경쾌해짐</p>	고장	삼음교,삼리,곡지,음교,복결,관원,기해,중완,대장유, 신유,삼초유,비유,백회
<p>고혈압은 병이 아니고 변증이다</p>	고혈압(본태성)	삼리,곡지,중완,관원,고향,백회,폐유
	고환염	<p>tm 삼리,곡지,폐유,고향,간유,신유,중완,천추,수도 , 중극,회음 통증심하면 삼음교,중극,상료에 30장정도 뜬 cm 대추하고 삼음교</p>
<p>류머티스성 관절염 과 퇴행성 관절염으로 분류된다. 류머티스 관절염은 붓고 सू시모 통증이 있다. 특히 아침에 일어난 직후가 더욱 심하다. 관절이 아프고 뻣뻣하여 잘 걷지 못하는 증상이 있다. 퇴행성관절염은 장시간정역</p>	관절염(무릎관절염)	<p>tm 양슬안,양릉천,삼리 ,아시혈 , 많이부었을때 양구,혈해 cm 양슬안에 자침시 각각 반대편을 향하여 , 사자한다</p>
	관절염 (슬관절염, 무릎관절염))	tmcm 양구,혈해,내외슬안,슬곡,곡천,음곡,위중,위양
	관절염좌(=타박상)	<p>타박 부위와 염좌 주위의 가장 아픈 곳 tm 아시혈 cm 아시혈, 부어있는경우 반사법으로 견측에 유침</p>

<p>※ 관절부가 붓고 통증</p> <p>▶염좌 주위에서 가장 아픈 곳에 다장하면 한번에 완쾌될 수 있다.</p> <p>▶발목이 뻐 경우 먼저 찬물에 담그는 것이 좋다.</p> <p>통증이 없어지면 붓는 것도 없어진다.</p>	관절염좌(뻐)	<p>▶丘墟자리에 문제가 생기는 경우가 많다.</p> <p>解谿, 中封, 太谿, 申脈, 照海.</p> <p>▶발등일 경우 足臨泣</p>
<p>등산 또는 걷다가 "다리 빠끗"으로 손목, 발목 뻐 경우</p> <p>발목뻐끗 = 고관절염좌</p>	관절을 빼었을 때 (=관절염좌)	뻐끗을 눌러보아 통증이 매우 심한곳 4~5군데를 꼭 짚어 피를 낸다.
<p>입안 점막과 잇몸, 입, 천정, 혀 바닥에 등글고 작은 흰 반점이 군데 군데 생기는 입안 병을 말한다</p> <p>저 턱머리가 으구되거 쳐려 보이다</p>	구내염 (유아)	tm 신주, 곡지 cm 지창, 승장
<p>갑자기 한쪽 얼굴근육에 마비증상 및 얼굴이 뻐뻐하다</p> <p>귀바퀴에 빠근하고 둔한 통증이 있다.</p> <p>소리가 크게 들리고 때로 혀 앞 2/3 부위의 미각이 약해지며 침, 눈물 분비 장애가 있다.</p>	구안와사 (안면신경마비)	tm 전신조정 목적으로 삼리, 곡지, 관원, 천료, 신주, 간유, 신유, 중완 국소적으로는 환측의 풍지, 완골, 현로, 견정에 연 3일간 하고 3일 쉬었다가 다시 한다 (반복) cm 견측: 족임음, 양릉천, 풍시, 간사, 풍지, 예풍, 협거
구토	구토	<p>내정기 특효.</p> <p>Tm 삼리, 곡지, 구미 (또는 거궐), 중완, 좌양문, 중극, 지양</p> <p>임신오조의 경우: 거궐에 뜸</p> <p>cm 신장결석으로 구토증상 있을 때 효과적: 삼음교, 신유, 천추</p>
아기가 젓먹고 반복적으로 토하는 경우	구토 (아기 구토, 토유)	유아는 유침 하지 않는다 신주, 거궐에 사상구 한다
	구토 (임신 구토)	Tm 거궐 (일곱장 정도 뜸)
	귀두염	삼리, 곡지, 간유, 신유, 상료, 중완, 중극, 회음
	근육류마티스	삼리, 곡지, 중완, 관원, 폐유, 고향, 간유, 비유, 신유, 아픈 부분에 아시혈
<p>음식 먹다가 체했을 때</p> <p>먼저 명치뼈 뒤쪽 부분이 결리고 답답해진다</p> <p>차츰 참기 힘든 고통 따르며, 얼굴 창백, 이마에 식은땀</p> <p>기운이 쪽 빠지고 힘이 없어지며, 손발 싸늘</p>	급체, 식체	<p>cm 소상 양쪽 사혈 후 등을 탁 친다.</p> <p>식도에 얹혀있는 음식 덩어리가 위로 떨어지게 하기 위한 것</p> <p>여태 추가 (필요시)</p>
<p>코의 증상 (재채기, 콧물, 코막힘, 목 아프고, 기침, 목에 가래 끓는 소리, 담이 나옴) 기관지의 증상 (숨이 차고, 기침, 담)</p> <p>*. 가래와 숨이 찬 증상 => 위기, 신기, 폐기보, 어깨통증 견정, 심유</p>	기관지 천식	<p>tm 무극, 견정, 심유, 격유</p> <p>cm 뜸과 병행, 15분 정도 유침하면 가래 앉는 경우 많다</p> <p>옛부터 폐유, 심유 + 격유를 四華, 六華라고 부르며 즐겨 썼다</p>
<p>오한, 발열, 두통, 기침, 진한 가래</p> <p>=> 열은 폐유, 풍문 다장, 가래 천돌뜸</p> <p>기관지 점막의 급성염증</p> <p>기침, 가래, 흉통, 전신절통, 식욕감퇴, 두동, 미열</p> <p>풍, 한열 등 외감사가 기표나 폐에 침입하여 폐기를 장애하여 생김</p>	기관지염 (급성)	<p>tm 전중, 풍문, 무극</p> <p>처음 감기로 열었을 때: 풍문 or 폐유 9~15장</p> <p>급성 기관지염 환자 중에서도 맥박이 빠른 사람은 현재 심하게 앓고 있는 사람이며, 이때 열이 나면 풍문에 뜸을 하여 땀을 많이 나게 한다.</p>
<p>기침, 가래, 때론 호흡곤란 겸함 만성 기관지염의 악화기에는 급성과 비슷한 증상</p> <p>=> 소량 객담, 호흡곤란, 피리소리, 객담 => 장기 간뜸 요함</p>	기관지염 (만성)	<p>tm 천돌에 침뜸</p> <p>가래가 안 없어지면 폐유, 고향, 심유, 격유, 전중, 거궐</p> <p>그래도 안 떨어지면 10장이상 다장구하고 한번쯤 자기나이가 될 때까지 연장구해도 좋다.</p> <p>오래가면 삼리, 곡지, 신유, 중부, 중완, 관원 추가</p> <p>cm 천돌</p>
<p>기침, 가래, 각혈, 호흡곤란, 발열, 식욕감퇴, 권태감, 체중감소 등 가래량이 많고 냄새가 난다 특히 이른 아침에 잠자리에서 일어나면 기침과 함께 많은 양의 농담이나 혈담이 나오며, 가래를 그릇에 담아 놓아 두면 3층을 이룬다.</p>	기관지 확장증	<p>tm 전중, 풍문,</p> <p>삼리, 곡지, 중완, 폐유</p> <p>풍문과 폐유에 15장 정도 다장구 할 수 있다</p> <p>cm 은 tm 병행</p>

<p>마른기침은 후두염,기관지염의초기,자극성가스와 먼지흡입,늑막염 때 보인다.</p> <p>가래를 동반하는 기침은 기도,기관지의 염증성질병,폐렴때임</p> <p>발작성경련성기침은 백일해등에 나타난다</p>	기침	<p>침이 우선이고 효과없을때 뜸 병행</p> <p>장기간 삼리,곡지,견정,폐유,고황,천종,거결,중완,기해에 뜸한다</p> <p>cm 견정,염천,천돌,예풍</p> <p>, 객담많고 떨어지</p>
목구멍이 간질간질하면서 기침 나옴	기침(마른기침)	cm 염천,예풍
	난시	삼리,곡지,백회,천주,신주,고황,간유,신유,화료,목창,중완,관원
잘듣지못하는 청력저하	난청 (=이롱)	<p>tm 이문,풍지,협계,예풍,청회,청궁,완골,신유</p> <p>cm 예풍에 심자</p> <p>*병원에서 메니엘씨 병으로 확진된경우는 청궁,예풍,풍지,태충,내관,족삼리,완골에 뜸한다</p>
고서에 청궁과 족규음뜸	난청 (=이롱)	이문,청궁,청회,풍지,협계,족규음
자율신경장애에 의한 혈관운동의 조절장애로 아랫배와 손발등이 찬 증후군을 말함	냉증	<p>tm 비유,신유,양관,천추, + 무극</p> <p>,- 손바닥이 시리면 : 노궁</p> <p>,- 발바닥이 시리면 : 연곡 또는 용천</p> <p>,- 머리가 시리면 : 백회</p> <p>,- 하복부가 냉하면 : 관원 에</p>
냉은 헌데서 나오는 진물로 쉽게 낫지않음	냉증(여성이않는냉증)	<p>cm 냉이흐름 : 삼음교</p> <p>, 냉외에고름나올경우 : 삼음교 아래 1촌 부위</p>
책읽는거리가 점차 멀어짐 , 평균 45세에 온다	노안	삼리,곡지,폐유,고황,중완,기해,관원,백회,풍지,천주,대추,간유,신유,화료,양노,천죽
안압조정기구의 장애로 방수가 잘 흘러나가지 못하여 안압이 높아지고 그로인하여 시신경이 위축 변성되어 시각기능이 장애된 눈병	녹내장	삼리,곡지,백회,천주,풍지,대추,각손,화료,폐유,고황,간유,신유,중완,관원
<p>눈이 아프고 두통에 구토증세까지있다</p> <p>갑자기 눈이 빠질듯 아프고 심한 두통에 속이 미식거린다</p> <p>, -->내가 뭘 잘못 먹었나 한다</p> <p>,- 편두통이 생기고 눈이 빠질것 같이 아프다</p> <p>,- 매스꺼워 구역질이 나며 토하기도 한다</p> <p>,- 안구결막이 충혈되고 각막이 뿌옇게 흐려진다</p> <p>,- 동공이 커지고 푸른빛을 띤다.</p> <p>저두은 쳐다보며 두 주위가 무지개처럼 보인다</p>	녹내장(급성녹내장)	<p>응급처치(사혈)</p> <p>,- 팔사, 상양, 대둔</p>
<p>뇌동맥이 좁아지면서 뇌혈류장애로 뇌 조직이 변성 괴사되는병</p> <p>중풍의 중경락 범주에 속한다</p> <p>,머리 무거운감,손발저린감이 혈전발생에 선행하며 일과성 수족 마비가있은 후 양다리의 반신마비,지각장애,실어증이 천천히온다</p>	뇌경색	<p>무극 + 신이 약하면 신유,</p> <p>, 간이나뻗면 간유,우양문,우기문</p> <p>cm 뇌경색 증상으로 갑자기 뒷 목덜미가</p> <p>, 뻗뻗해지면 천주,풍지에 유치해둔다</p> <p>,- 팔꿈치가 오그라드는경우 : 곡택</p>
	뇌연화증	삼리,곡지,폐유,고황,심유,간유,비유,신유,중완,천료,중완,관원,백회,지양
<p>혈압이 높아져 뇌 혈관이 터진 결과 의식상실,반신마비,언어장애</p> <p>전조증상이없이 심한두통,어지러움,메스꺼움,구토등의 뇌압상승증상이 오면서 의식장애,심하면 혼수상태에 빠진다.</p>	뇌출혈	<p>tm 아시혈(중풍으로 마비가 온 반대쪽 머리를</p> <p>, 더듬어 만져보면 말랑말랑하거나 튀어나온 곳)</p> <p>cm 곡빈,견정,풍시,현종,삼리,곡지</p>
정신을 잃고 얼굴이 사색, 치료보다 구급이 급하다	뇌출혈 로 쓰러진 경우	<p>cm 심선혈 사혈,인당사혈,인중사혈,소택사혈</p> <p>tm 중풍7대요혈 다스림</p> <p>, 백회,곡빈,견정,풍시,현종, 삼리,곡지</p>
	뇌중혈	삼리,곡지,중완,천주,신주,고황,신유
소변이 계속 마렵고,소변후에도 개운치 않음,아랫배가 아프기도하고 무겁다	뇨의빈삭	삼음교,태충,신유,차료,간유,중완,중극,백회

소변이 방울방울 떨어지거나 완전히 소변을 누지 못하면서 배뇨통, 잔뇨감, 혈뇨가 있거나 소변이 세지않고 소변줄기가 끊어지는것	뇨폐증(요폐증)	tm 삼음교,신유,명문,상료,중극,수도,음교,수분,중완 , 혹은 용천 과 중극에 다장 하기도한다 cm 삼음교,중극에 유침(20~30분정도)
눈이 피로하다	눈의피로	동자료, 풍지
늑간신경주행에따라 발작성 및 지속적 통증이 있는데 통증은 1~2 개 늑골에 국한되며 기침,재채기 깊은 호흡때 심해진다. 흉추 교감신경절장애 때에는 각이한 크기의 대상포진이 생긴다.	늑간신경통(기담,담)	아시혈에 뜸하고, ,만성인경우는 아픈쪽의 반대쪽 양릉천,구허에 , 7~15장 뜸한다. , 그래도 완쾌되지 않으면 , 삼리,곡지,폐유,고황,간유,담유와 직접부에 뜸한다
	늑간신경통,호흡곤란	극문,양릉천(건축, 환측아님)
호흡시 옆구리 결림,발열,식욕무 ==> 폐결핵 치료 기준, 극문은 명혈	늑막염(흉막염)	무극,거괘,극문,연액,격유,간유,비유,신유,,기문 ,환측,극문,연액,환부에 아시혈
맥립증으로서 속눈썹의 모낭,피지선의 급성화농성염증	다래끼(눈다래끼)	tm 눈위쪽 : 반대측의엄지손가락 대골공 , 눈아래쪽 : 반대측의 해계 혈 , 심장관계시 후계 , 추가여기나 지방반지양해 .
온몸,손,발,겨드랑이,얼굴등 국소에 특별히 땀이 많이 난다. 주리가 든든하지 못한데다 비위의 장애로 생긴 습열이 기육에 몰리거나 선천적으로 양기가 허하여 생긴다.	다한(증)	tm 삼리,곡지,폐유,고황,신유,중완,관원
온몸에 땀이 흠뻑젓는다	다한(증)	대포 양쪽중 아픈곳의 상하 3cm 중 아픈곳에 피내침, 일주일애 한번 피내침 교환
갑자기 떨리면서 열이나고 오른쪽 상복부에서 어깨와 가슴으로 퍼지는 아픔이있다. 아픔이 있는 부위를 누르면 강한 통증이 있고, 구토와 황달 증상이 동반된다. 음식조절을 잘하지못하여 비위에 습열	담낭염(급성)	침뜸치료전에 원인균에 대한 항생제 치료를하면 치료효과 높이고, 부작용 없앨수 있다. tm 양릉천,담유,장문,양문,기문,일월,족삼리 cm 담유,태충,양릉천,지양,격유,간유,담유,구허,삼음교
오른쪽 옆구리에 압통및 저항감이 있고, 담낭종대가 있을수 있다 급성과 동일하게 치료	담낭염(만성)	침뜸치료전에 원인균에 대한 항생제 치료를하면 치료효과 높이고, 부작용 없앨수 있다. tm 양릉천,담유,장문,양문,기문,일월,족삼리 cm 담유,태충,양릉천,지양,격유,간유,담유,구허,삼음교
돌연 멍치골에 치밀어 오르는 심한통증으로 오른쪽가슴과 어깨,팔에 퍼진다.발작은 지방이많은식사나 과식후 3~6시간 지나생김 자주 메스꺼움,구토,오한발열 담관이막히면 혈중빌리루빈이 많아지고 소변에 빌리루빈이 나온다.대변은 재색빛으로 된다.	담석증	지속적으로 뜸하면 담석은 자연히 없어진다. Tm 우肩井, 지양,우간유,우담유,신유,우불용,우양문, , 좌활육문,수도 +무극 cm 통증경감 목적임 , 태충,공손,내관,중완,우양문,우불용,견정
당뇨발생의 뿌리는 신장임 - 움직일수 있는 손과발의 말단이 저림 - 어떨때는 아프고 어떨때는 시리는 차이가 있지만 늘 저림 - 당뇨가 심하면 손끝과 발끝이 저리고 아프고 시린증상이 , 동시에 나타남. * 당분과다섭취, 장기간음주, 폭음, 장기간 피부병약 복용, 정신적 스트레스. ※ 三多病(다음, 다식, 다변) 구갈, 소변중당분. 과실향, 권태감, 불면, 두통, 피부건조, 소양증, 괴저, 좌골신경,백내장 등	당뇨병	tm 간유,비유,신유,거괘,좌양문,좌기문,지기 +무극 , cm 뜸자리에 병행 갈증(구갈)심하면 태계, , 여자는 삼음교, , 입마르면 지창 ,
신경주행과 일치한 피부에 띠 모양으로 소수포가 배열되는 수포성-바이러스성 피부병이다.	대상포진	tm 직접 환부에 뜸하는데 처음 발생된 부위와 가장 아픈 부위 처음과 끝을 위주로 한다 cm 태충(피소독장기),축빈,혈해,폐유,고황(열경감) , 외관(걸,피부),직접부위에1~2cm간격 유침
일반병원성세균에 의해 생기는 질염이다. 5색대(백대,황대,적대,청대,흑대)	대하	tm 급성으로 오래안된것: ,중극,곡골,삼음교 20~30장 뜸 1회 만 성일때: 견외유,간유,신유,상료,요유,음교, 곡골,삼리,곡지,중완,수도,중극 cm 뱀 새나는것 없애려면: 중극에 심자
운동장 조희시 쓰러지는 아이, 군인들 행군 도중 졸도 ,가벼운경우는 두통과함께 현기증을 느끼며 가슴 답답, 속이 , 메스껍다.입이 마르고 땀이 나지 않으며 고열과 함께 불안, , 초조, 전 시무력감 나 낫다.	더위먹었다=일사병=중서	사혈한다(응급조치), 심선,수십이정혈, 곡택, 위중

밤에 옷이 젖을 정도의 땀 ==>폐유,고황(땀구멍단계)이 요혈 잡들었을때만 땀이 나는거 허약체질,과로후의 쇠약자	도한	무극, 신유
동상이란? 겨울에 손발에 부종성홍반 이 생기는 병 저온노출, 虛症. ※ 1도 : 피부발적, 부기. 2도 : 물집. 3도 : 피부조직 괴사	동상(凍傷)	tm 삼리,곡지 ,다리동상시: 용천,조해,신맥 ,손가락동상시 노궁 , 凍傷은 대개 순환기가 약한 사람이 걸리기 때문에 전 신순환을 도와야하기 때문이다. 발가락에 생기면 湧泉, 照海, 申脈을 가하고 凍傷부위가 녹으면서 붓고 가려우면 그 中央에 3장 정도 뜨면 가려움이 사라진다. 가려움이 없어질 때까지 뜨는데 얼굴은 하지 말고 손
피부 부분부종,붉은 팽진,가려움증 ==>폐대장을 보하여 피부저항력제고	두드러기(담마진)	tm 견정,견우,간유,신유,대장유,대거,축빈 + 무극 cm 병행
피부 부분부종,붉은 팽진,가려움증 ==>폐대장을 보하여 피부저항력제고	두드러기(담마진)	위기보혈 대거,축빈,은백,견정,견우,폐유,간,비,신유,대장유
외감,질정,장부허손,타박등으로 머리에 기혈순행이 장애되어 생긴 다고본다. 풍한두통,풍열두통,간양두통,기혈허두통	두통	만성적으로 아픈 두통에는 tm 폐유,고황,신유,천주,삼리,곡지,백회,중완,관원 cm 실증으로 인한 심한 두통(합곡 에 10분 유치), , , 胃 관계로 눈언저리 붓거나 미릉골통 시 내정에 유치 하면 붓기가 금방 빠진다.
머리속이 따로노는듯 골이 흔들리고 아픈경우 심을 보해주어야함.	두통 (골이흔들려)	tm 무극보양뜸
눈썹머리 통증	두통 (미릉골두통)	cm 내정, 합곡
반드시 옆머리로 흐르는 담의 경락 치료	두통 (옆머리편두통)	cm 구허,임읍,완골
신이 허해서 옴	두통 (윗머리두통)	cm 백회,신유,복류
전구증상으로 눈앞에 뭔가가 아른거리고 안개낀것 같으며,메스꺼 움, 그밖에 몸에 이상지각,후각과민,전신무력감,졸음,현훈등이있다 그후 몇시간 또는 2일정도 끄는것도 있으며 한쪽 두통이 심해지고 박동성이 있다. 여성들에게서 통증이 월경주기와 일치될수도있다. 전구증상이 없거나 심하면	두통 (편두통)	tm 뜸치료 처음 ,두통이 있는 쪽만 뜸, 건측은 손대지않는다. ,풍문,천주,풍지,견외유, 환측에 7~10장 뜸 뜬다 이상과 같은 치료로서 안될때는 전신요법으로 , 심유,간유,신유,잔중,수
근본원인은 방광	두통 (후두통)	cm 중극, 천주,풍지,곤륜,신맥
- 피부가 마르고 거칠고 윤기가 없음, - 폐의 양쪽 가슴이 균형을 이루지 못함 - 맥을 잡으면 맥이 얇고 떠는 부맥 으로쪽 손목이 차가워서 튀겨 나가듯한 현맥이 자	두통(폐의문제로인한)	cm 뒤 천주, 간유,신유,지실, cm 앞 곡지,삼리,합곡,천주,중완,관원,기해,양로
신이 허해서 오는 요통에서 시작되고 허리뼈가 뻐것이 오래되거나 반복된것임 뼈사이가 벌어진 쪽, 그힘이 없어진 쪽을 되살림	디스크	tm 신유, 3,4,5하요추,포황,양릉천+무극 cm 신유, 3,4,5하요추,양릉천,복직근위,천주 , 대 거,은문,승근
허리통증,둔부로 방산통,4요추~1천추 사이 압통이 있다.	디스크 (요통)	tm 천추, 신유,대장유,양관,요유 , 때로는 간유,상료, 차료,삼음교 추가 cm 신유, 3,4,5하요추,양릉천,천추,대거
팔은 잘 돌아가지만 주로 손이 저리고 어깨가 저릴때도있음 , -천중,고황을 눌렀을때 손가락이 저리면 흉추기 문제이지만, , -천료를 눌렀을때 손가락이 저려올 경우임 , -해당되는 목뼈를 눌러보면 탈이 난 곳을 찾을수 있음	디스크(목디스크)	tm 저린손의"중저",양지,외관,천료,천중,고황,무극 , 세마디가 함께 탈이나므로 중심점과 위아래옆 cm 저린손의"중저",양지,외관,천료,천중,고황,무극 , 세마디가 함께 탈이나므로 중심점과 위아래옆
위한애역,위열애역,간울애역,비기허애역	딸국질	tm 먼저 소상,폐유,지양,구미 10~20장 그치지않으며 사리 배회 겨우 가운 위유 중완
멀미대처방법	멀미 대처방법	사혈(응급조치) 여제애문 신완

기운이 없고 얼굴이 창백하고 토함	멀미 발생시	cm 합곡
멀미 예방과 치료	멀미 예방	tm 백회
	목사혈	승읍,사백,양백,사죽공
신맥,조해,용천,아시혈	무좀(발)	일반치료후 재발시 발은 신맥,조해,용천,아시혈 뜸
손과발에 작은 물집,구진,농포,미란,진물,비듬,각질등	무좀(백선,버짐)	tm 삼리,곡지,중완,관원 , 손에생겼을때: 직접가려운곳 + 반복하여 뜸한다 , 그래도 완쾌안되면 : 노궁,태능,신문,국소부위 , 발에생겼을때: 직접가려운곳 + 반복하여 뜸한다 , 그래도 완쾌안되면 : 신맥,조해,용천, 국소부위
노궁,대릉,신문,아시혈	무좀(손, 손무좀)	일반치료후 재발시 손은 노궁,대릉,신문,아시혈에 뜸
상성, 천주에 뜸 5장(초기)	무후각	위기보혈,상성,신회,천주,폐유,비유 tm 5장씩 2개월이 상
나이 사십을 바라보는 남자는 거의 다 한순간에 양기가 사라져 발 기부전 상태가 온다.	발기부전	tm 관원,기해 + (상료,중료)
	발목뻐(발목염좌)	cm 구허(잘들어간다),해계,태계,중봉 , 발목 아래만 다쳤을때 :임읍
빈뇨와 오줌눌때통증,고름오줌의 3대증상있음, 방광부위가 무거운 느낌이 심하다. 치료후에도 재발 방지와 건강을 위하여 경골과 곡천에 계속 뜸해라	방광염	tm 수분,곡골,방광유,신유,간유,경골, 곡천 , 삼리,곡지,중완,고황, cm 중극(전음부위까지 도달하도록 심자), 수도에 지치
방사과다한 남자에게 중풍은 거의 필연, 바람이 났거나,나이들어 한참 어린 색시에게 새장가든 남자치고 병치레로 말년을 맞는 경우	방사과다	tm 상료,중료 + 무극
배뇨에 장애가 생긴 경우(소변을 잘 통하게 해야함)	배가부어오른경우	tm 중극,수도
식사후 열이 나면서 토하며, 배가 아프고 추운 경우	배아픔	cm 합곡,양구,격유, ,tm 지양,중완,거궐
수정체가 흐려지는 눈병 수정체가 흐려져 동공이 희게 보이고 시력장애가 있는 것이 모든 백내장의 공통증상이다	백내장	삼리,곡지,백회,풍지,천주,대추,폐유,간유,신유,중완,관 원 *때로는 각손에 10장이상을 5일간격으로 떠보기도한 다.
급성호흡기성 어린이 전염병	백일해	신주 -->폐유,격유,천돌,잔중,중완,곡지
독충, 독사 등 ※ 국소발적, 종창, 통증, 임파관/선염, 작통 ▶개미, 모기 등 가려운 데는 반미립대로 2~3장 뜨면 즉효. ▶별이나 썩기 등에 쏘이면 미립대로 통증이 잡힐 때까지 뜬다. ▶독사나 지네에게 물리면 생명이 위험하므로 사정없이 뜬다.	벌데물린데(독충자상)	,개미,모기 :반미립대 2~3장 ,개비,벌,썩기,독나방:쌀알크기로 통증없어질때까지 ,지네,독사 :처음에는쥐똥크기 이후에는 도토리크기 cm 환부에 삼릉침으로 점자하면 노란물이 나온다. , 뱀에물려 사물이 두개로 보일때 축빈에 유침
복부 팽만감,헛배,권태,식용부진,두통,구토,불면,치질,신경통등 유발 실증:열비,기비, 허증:기허비,양허비,혈허비	변비	tm 삼리,기해,황유,중완,대장유,신유,이신문,좌요안 , * 좌측요안:변비요혈,압통있으면 뜸 , * 좌측 복결과 부사사이뭉쳐진곳에 뜸 cm 좌대장유(0.5촌,좌측장골극(내하사자),장강 신항구변비유인 경우 상요,관원,기해,중극
급성시 극렬한 복통,심한 구토,딸국질,사지궤냉,오한,발열,변갈,변비 대부분 수의내로 사망	복막염	삼리,곡지,폐유,고황,지양,간유,비유,명문,중완,수분,천 추,음교,수도,중극
가스또는 공기가 배안에참 주로 소장 대장임 헛배부르기,복통,호흡곤란, 식욕감퇴	복부창만	tm 삼음교,삼리,곡지,음교,복결,관원,기해,중완,대장 유,신유,삼초유,비유,백회 cm 천추 : 만성이 되지 않은 경우는 30분정도만 유침 해도 유침도중 효과가 나타나는경우도 많다.
배에 가스차는것 같고,숨이가쁘며,배뇨장애,복부팽만있음. 복부의 모양이 변하여 배꼽이 없어짐.피부는 청백색이 되어 광택이 없어지고,소변량이 줄어드고,호흡곤란으로 복통,만지면 파동을 느 낌	복수	tm 지양,간유,비유,경문,신유,음교,수분,전중 , (삼리,곡지,폐유,고황,중극,수도,중완) cm 합곡,태충,삼음교,천추 , 족삼리,중극,수도,중완 절대 강자극하지말것 복수가차면 심장에 압박을 주므로 숨이 가바진다. 따

어린이의 위나 장안에 가스가 차서 배가 불어난 상태에서 통상 헛배부르기다	복창(어린이복부창만, 헛배부르기)	tm 중완 전체치료: 삼음교,삼리,곡지,음교,복결,관원,기해,중완,대장유,신유,삼초유,비유,백회 cm 천추 : 유침하문 효과적이다
배앓이,배꼽주위둔통,복부창만,설사 약화기에는 복부창만,식용감퇴 있으며,대변회수는 보통3~4번, 배변전에 경련성통증 있으나 배변후에는 없어진다. 대장염이걸치면 혈변있다. 진찰에서는 배꼽주위와 회맹부압통,배알이등이있고 결장주행에 따르는 압	복통(급성)	cm 복통은 원인이수없이 많으므로 원인찾아서치료, 소상 사혈 : 웬만한것 나음, 만나면 심각 정확한 병인 찾아야한다, 합곡, 태충, 내정에 유침 : 효과적일때가 많다
갑자기 구토와 설사 복통이 있다	복통, 설사, 구토(급성)	응급처치(사혈) - 심왕, 소상, 여태
체내에 수분이상으로 축적된 상태	부종	기본(삼음교,수분,신유,중완,중극,수도), 간에서 온것(간유,담유,삼리,우기문 추가), 신장에서 온것(천추,지실,용천 추가), 영양실조와 빈혈로 인한 것(백회,폐유,고황,간유,비유,중완,우활육문,좌양문,기해,삼리 추가)
	불감증	백회,신주,심유,간유,신유,양관,중완,수도,곡골,태돈,대맥,음교,중극,차료,하료,삼음교
불면증은 대개 간경 과 심경이 흥분해서 온다	불면	tm 삼리,곡지,백회,완골,천추,간유,신유,거골, 중완,관원 cm 인당,간유에 유침하면 금세 잠이 온다 **완골이 불면증에 요혈이다.
	불면증	간유, <과거 중이염때문인불면 : 완골>
원인은 여러가지이나 대부분 마음의 병으로 심장에 화가 물리거나 간의 경맥인 간경이 흥분해서 일어난다	불면증(침뜸승부내용)	cm 신문,거골, 행간, 백회
불임이란? 2년이 지나도 임신못하는것 남자 : 신이 허한 경우	불임	남자 : 천추,신유,간유 + 무극 여자 : 대거(or외릉),차료,중극,수도,삼음교 + 무극
비루관이 폐쇄된것 눈물이 늘 나온다	비루관폐쇄증	삼리,곡지,백회,두임읍,천추,풍지,견외유,대추,폐유,고황
코점막에 생긴 급성염증, 일명 코감기 코막힘,콧물,미열	비염(급성비염,코감기)	풍문,상성 다장구 , -->안나오면: 무극추가 cm 콧물이 심할경우 어제에 자침 ** 소아는 신주,폐유,신유,상성에 뜬** 비염의 특효혈은 상성에 뜬
증상: 양쪽이 엷바뀌가며 코가 막히고 콧물이 많이 나온다	비염(고맹이)	** 소아 : 신주,영향, 폐유(t),풍문(t),상성에 뜬 ** 비염의 특효혈은 상성에 뜬
증상: 양쪽이 엷바뀌가며 코가 막히고 콧물이 많이 나온다	비염(만성)	풍문,상성 , -->안나오면: 삼리,곡지,폐유,고황,신유,중완 cm 콧물이 심할경우 어제에 자침 ** 소아는 신주,폐유,신유,상성에 뜬** 비염의 특효혈은 상성에 뜬
국부에 둔통,밤에는 불면증,낮에는 잠이 쏟아짐,소화기 기능저하 수면부족,과로,전염성질환에서 오는것,과다당분섭취로 발생	비장비대증	삼리,곡지,폐유,비유,중완,백회(말라리아-황문두,엄지발가락)
얼굴이 파랗게 질리면서 기절하는것.	빈혈(뇌빈혈)	삼리,곡지,중완,기해,잔중
	빈혈(재생불량성빈혈)	
	사마귀(우체)	직접 해당 부위 , 처음에는 뜨겁지만 계속 뜨면 덜 뜨겁다 ,다뜻후에 물을 발라두면(부풀어서 크게 더 잘 떨어진다) 물집이 생기고 물집 생기면 반드시 떨어진다
사춘기 질환	사춘기(여자의사춘기병)	tm 백회,전중,신유,심유,천추,삼음교,무극 cm 병행

<p>얼굴 한쪽에 발작적인 격심한 통증 및 국소 경련 심한 경우에는 말하거나 음식먹을때,면도질,세수와 같은 약한 자극 에도 통증이 유발된다. 중추성인 경우에는 지각장애,국소경련이 겹치며 원발성인 경우에는 는 지각과민이있다.양백혈(안신경),사백혈(상악신경),협승장(하악신 경)혈에 압통점이 있다.</p>	삼차신경통(안면신경통)	tm 삼리,곡지,중완,천주,풍지,대추,완골, , 제1지에는 두유에서 3cm상방에 뜸 , 제2지에는 현로를 더하여 뜬다. , 제3지에는 곡빈,정영,완골에 7~10장 뜬다
<p>어깨통증, 견비통, 견통 범주에 속한다. 목뒤쪽 아래와 쇄골상부 즉 상박 신경통이 지배하는 부위에 둔하고 저리면서 쏘는 방산통이 있다. 목과 상박,어깨를 움직이면 아픔이 더 심해진다.운동기능이 약해지고 운동폭이 제한되며 팔의 힘이 약 해지고 근위축이 오며 근긴장도는 낮아지고 지각이 둔해진다. 쇄골 하동맥이 압박되어 팔이 저리고 손이 차거나 손끝이 파래지기도 한 다</p>	상완신경마비 (어깨목통증)	tm 대추,고황,천종,천료,견중유,견정,견우,곡지,공최 , 다음은 필요에 따라 선혈한다. , 小海, 少海, 지정,신문,외관,내관,태릉 cm 뜸과 병행 특히 주사시의 잘못으로 마비가 된 것에는 직접
죽 또는 물모양의 배변	설사	tm 식사성인것 : 삼리,양구,중완,좌양문,수분,중극,지양,장 염및장결핵: 삼리,곡지,폐유,고황,격유,신유, , 대장유, 중완,중극,기해,천주
<p>기력없고,동작느리고,두통,현훈,불면증,건망증 앓다 정미 자주변하고 눈이 잘 보이지 않으며 잘듣지 못하고 팔다리가 저리다 혈압이 오르며 동맥벽이 굳게 만져진다.</p>	성인병(동맥경화/생활습 관병)	tm 견외유,지양,심유,격유,간유,신유 , 삼리,곡지,고황,폐유,중완,기해,관원 cm 뜸병행
<p>기본은복통,구토,설사,배알이 ,소장:물모양설사 하루4~6회 ,대장:설사10번이상이며 점액이나 피가 섞이고 양이 적다 뒤가 무거운감, 고열나며 설사와 구토가 심하면 탈수상태에 빠짐, 혀가 마르고 배꼽주위 또는 대장주변에 압통 있음</p>	소대장염(급성)	tm 대장유,격유,천추,중극,신유 , 통증 심하면 이내정에 뜨거움 느낄때까지 다장구 cm 급증: 합곡, 삼리 , 전체치료: 기해,천추,중완,지양,격유,대장유,소장유 *급성장염 침치료시 조금심자(1.6촌의반정도) 유침
<p>배알이,배꼽주위둔통,복부창만,설사 악화기에는 복부창만,식용감 퇴 있으며,대변회수는 보통3~4번, 배변전에 경련성통증 있으나 배 변후에는 없어진다. 대장염이겹치면 혈변있다. 진찰에서 는 배꼽주위와 회맹부압통,배알이등이있고 결장주행에 따르는 압 통이 있다.</p>	소대장염(만성)	tm 뜸치료가 잘 듣는 질환임 , 중완,좌양문,천추,대장유,신유 가 요혈 , (삼리,곡지,중극,수도,기해,거골) , cm 통증심하면 천추, 족삼리에 유침 , 복부창만시:장문,지기
<p>소변 하루에 10번이상봄(정상인은 하루 4~5회) 일반적으로 배뇨 시 아랫배나 요도 아픔없다. 특히 야간에 소변을 자주보는 경우가 많은데 이를 야간빈뇨라함</p>	소변빈삭	tm 삼음교,태충,신유,차료,간유,중극,백회 , 또는 중극에 다장구한후 2~3일후 완쾌되는경우 있음 cm 조해,삼음교,중극,수도(30분유침) , 요통경하면 방광
	소아천식	신주 -->폐유,격유,천돌,잔중,중완,곡지
<p>처음에 설사 약간 하다가,점차 심해지면서 대변에 과립이 석여 나 옴</p>	소화불량	,-3세이하 : 신주,중완 ,-3세이상 :남자아이 : 왼쪽 간유,오른쪽 비유 , 여자아이 : 왼쪽비유,오른쪽 간유
<p>아시혈</p>	손알이, 생인손,생손알이	손가락 : 곡지,아픈손가락끝에서 첫번째 마디 , 황문의 양쪽 끝 발가락 : 삼리,아픈 발가락 발톱뿌리에서 , 2~3mm떨어진곳 손이면 曲池에 다장하고 아픈 손가락의 끝에서 첫번 째 마디 황문의 양끝에 미립대로 5장씩 뜬다. 발이면 三里에 다장하고 아픈 발가락의 발톱뿌리 에서 左右로 약간 뒤에 5장씩 뜬다. 가령 엄지면 大敦과 隱白정도를 뜬다.
	수명(눈부심)	찬죽-->삼리,곡지,폐유,고황,간유,신유,백회,대추,두임 음,천주,풍지,중완,관원
	술깼때,숙취해소	술곡
	관절염(무릎관절)	tmcm 양구,혈해,내외슬안,슬곡,곡천,음곡,위중,위양
	습진	tm 견우,비유,신유,대장유,축빈

가렵고 빨개지고 붉은 구진,급성과 만성 ==>비습제거,국부실땀,해독	습진	위기보혈, 건우,비유,신유,대장유,축빈,혈해,폐유
항상 무엇이 목구멍에 걸린느낌.음식물 넘길때 곤란하고 때로는 넘 어오기도 함.	식도염(식도협착증)	tm 격유,지양,전중,구미,거괘,중완,삼리,삼음교 (부인의 경우 중극,음교 추가) 급성 및 통증심할때 : 내정(침)
	식욕부진	삼리,곡지,간유,비유,위유,중완,우할육문,기해,관운
	신경쇠약	삼리,곡지,중완,관원,신회,천주,신주,신도,영대,심유,간 유,신유,신문
갑자기 온몸이 붓고 혈뇨와 고혈압등이 나타나는 병이다. 주 로 어린이,젊은이들에 발병	신염(급성)	Tm 삼리,곡지,간유, 경문, 폐유,고황,중완,수분,황유,기 해,중극 cm 눈두덩이 부었을때 내정,삼음교,합곡에 유침 만성되면 치료 어려우므로 급성일때 적극 치료 "내정"은 안면 부종에 요혈이다 붓기 잘내린다.
잠재기:자각증상 없거나 때때로 얼굴이 붉소,요통,약간의 단백뇨,혈 뇨 진행기:3대증상(부종,고혈압,소변소견)이 계속되면서 진장기능장애 나타남 말기:소변	신염(만성)	Tm 삼리,곡지,간유, 경문, 폐유,고황,중완,수분,황유,기 해,중극 cm 눈두덩이 부었을때 내정,삼음교,합곡에 유침 만성되면 치료 어려우므로 급성일때 적극 치료 "내정"은 안면 부종에 요혈이다 붓기 잘내린다.
갑자기 오슬오슬춡고 높은열이 5~7일동안계속된다 땀많이흘리고, 두통,전신쇠약,불쾌감,근육,관절통,메스꺼움,구토 신 장부의 동통,오한,발열,구토, 오줌의 감소와 동시에 피고름	신우염(급성)	tm 태계,간유,신유,지실,천추,거괘,음교,중극,수도 , 삼리,곡지,중완, cm 천추,태계,삼음교,중극,수도,간유,신유,지실에 조 금유침
잠재기:증상없음,가벼운피로감 활성기:오한미열,고열, 변량은 늘었다줄었다 하면서 부종,고혈압(80%)이 있으면 빈혈이 나타난다 급성 신우염과 동일	신우염(만성)	tm 태계,간유,신유,지실,천추,거괘,음교,중극,수도 , 삼리,곡지,중완, cm 천추,태계,삼음교,중극,수도,간유,신유,지실에 조 금유침
신장과 방광부위 통증,열이 나고,15~30분밖에 오줌을 못참음	신장결핵	삼리,곡지,폐유,고황,신유,중완,관원,척택
오줌의 변화,부종,혈압상승, 적갈색의 혼탁한 오줌,눈두덩이 에 부종,피로,권태,허리에 동통, 발열,변비,구토,두통	신장염(급성)	삼리,곡지,폐유,고황,중완,간유,신유,황유,경문,수분, 기해,중극
급성 신장염과 동일	신장염(만성)	삼리,곡지,폐유,고황,중완,간유,신유,황유,경문,수분,기 해,중극
성욕 및 기억력 감퇴,피로,두중,이명,식욕부진	신허	곡지,삼리,천료,폐유,고황,간유,신유,중완,황유,관원
기본증상은 심장부위 또는 흉골후면의 격심한 아픔이며 그밖에 심 부전의 소견,쇼크의 소견등 여러가지 합병증의 증상 있음 아픔 은 협심증발작이 번번히나타나다가 심해지기도하며 돌연히 격심한 아픔으로 시작되기도 한다	심근경색	tm 심유,지양,신유,잔중,거괘, , 삼리,곡지,백회,천주,고황,중완,관원,기해, , * 통증이 심할때는 (이내정) 에 뜨거움 느낄때까지 , 다장구한다 cm병행
심장부의 동통,압박감,안면창백,운동시 호흡곤란,피부점막의 색이 청색으로 변함	심내막염	삼리,곡지,신문,괘음유,심유,영대,신유,잔중,중완,관원, 백회
부정맥,흉부압증감	심장비대증	삼리,곡지,천료,좌천중,고황,신주,심유,지양,간유,신유, 관원,중완,백회
발작성 호흡곤란,질식감,부정맥	심장성 천식	삼리,곡지,천중,폐유,심유,격유,신유,중부,잔중,중완,기 해,신문
심장부의 압박감,흉부동통,심박수의 변화 ,부정맥,호흡곤란	심장쇠약	삼리,곡지,고황,심유,신주,지양,시뉴,잔중,중완,관원
심장부아픔(또는불쾌감),가슴두근거림,숨가쁨,불안,공포감,무력감, 어지럼증,불면증,수축냉증,자한,소화장애증상,신경질등이다. 맥 박,혈압,정진상,심전도상 아무런이상없음	심장신경증(화병)	tm 천주,백회,심유,간유,신유,신문,잔중,천주 , 삼리,곡지,중완 cm 뜸병행
피로감,호흡곤란,부정맥,빈맥,복부팽만	심장판막증	삼리,곡지,천료,천중,신주,고황,심유,지양,신유,잔중,거 괘,중완,관원
어릴적 건강은 평생 건강의 기초	아기 (10살전후 아이)	tm 폐유,중완,백회
아이에게 고열은 위험을 알리는 사이렌	아기 (갓난 아이의 경기)	cm 이침(귀끝) 사혈

젓먹이, 이른바 유아는 침과 땀을 처방 신주혈 한 군데만 땀을 떠 주면 잘먹고,잘놀고,잘자며,잘자란다	아기 (아이의 병치레)	tm 신주
젓먹이일때 머리에 열리 펄펄 끓고 목이 뻗뻗해지고 손발에 경련이 일어나는데 사시는 거의다 경기 때문에 움	아기 (아이의 사시)	cm 간유,태충,곡지,삼리,중완,동자료,찬죽,정명,합곡, 풍지,천주,백회,통천
	아기 (젓먹이 설사)	tm 중완
젓먹이가 갑자기 열이 올라 움뭉이 펄펄 끌을때	아기 (젓먹이 열이 펄펄 끌을때)	tm 신주 (땀 몇장하면 됨)
입안이 허는 것은 위의 음액이 부족하기 때문 -입안이 헐어 젓이 닿으면 쓰라려 엄마젖을 빨지못하고 자꾸 젓을 물리니 아기가 짜증을 내다가 젓꼭지를 물게 됨	아기 입안이 헐 경우	cm 지창,승장 (침꽃은지 5분 정도 지나니 젓을먹음
코가 막혀 입으로 호흡	코가 막혀 입으로 호흡 (아데노이드)	삼리,곡지,백회,폐유,고황,중완,예풍
	안건경련	예풍,완골,풍지
안검연염이란 눈꺼풀 기슭의 만성염증 눈꺼풀 기슭이 발적되고 눈꺼풀이 붓는다 점차 각질이 생기고 분비물과 유착되어 딱지가 앉는다 딱지를 떼면 궤양이 없는 평활한 충혈 면이 나타난다	안검연염	tm 대추,간유,상성,오처,각손,곡지,삼리,이간 , 혹 처음에 이간에 20~30장 다장하면 완치되기도 한다 *눈병 치료의 요혈은 "대추"혈이다. 잘응용해라
턱을 쳐들어서 사물을 봄	안검하수	삼리,곡지,백회,대추,천료,신주,풍지,예풍,곡차
눈꺼풀 내려앉아 눈을 못뜬 	안검하수	태충, 합곡, 양릉친, 영향, 중저 추가로(사죽공 찬죽 승읍,사백 ,거료)
조금만 봐도 눈이 피로하고 아프고 머리가 무거워짐	안정피로	삼리,곡지,백회,천주,신주,고황,간유,신유,화료,목창, 중완,관원
	야뇨증	5~10살(좌황유,명문) 10~15살(중완,좌황유,명문,중극,상료) 15살 이상(삼리,곡지,신주,간유,신유,명문,상료,좌황유,중극,중완,백회)
	야맹증(결막건조염)	유아(백회,간유,중완) 성인(천주,풍지,백회,화료,각손, 대추,간유,곡지,삼리,중완)
낮에는 별일없다가 밤에 발작적으로 갑자기 울고 그칠줄 모름	야제증	유아(백회,신주에 소구 3장 소아(백회,신주,간유,비유,중완)
	약시	삼리,곡지,백회,폐유,고황,간유,신유,중완,기해,관원, 풍지,목창
목구멍이 간질간질하면서 기침 나옴	어린이 침 흘리는 증상	cm 지창,승장
말을하려해도 혀나 입술이 자유스럽지 못하여 말할수 없는상태 뇌출혈의 후유증,뇌혈전의 증상의 하나로서 자주보인다	언어장애	tm 삼리,곡지,중완,기해,관원,천료,심유,신유,견정 cm 금진,옥액 (사혈) , 천주,풍지,예풍,염천에 유침
삼키기어렵고,삼킬때아픔 ,여러가지질병,정신적충격으로 기,혈,담이 서로 엉키거나 어혈로 위 구가 막혀서 또는 기혈부족으로 위기가 내리지 못하여 생김다	연하곤란	tm 격유,지양,전중,중완 cm 심유,거결,격유,예풍,천추,중완,합곡
외이도연골부위에 화농균이 침입하여 생긴 귓병 이통이 있는데 머리,이발쪽으로 뻗친다.특히 귀 바퀴를 당기거나 불을 누르면 하품을 하거나 음식물 씹을때 더 심하다	외이도염	곡지,예풍 에 10장이상 다장구 한번만한다. cm 병행
고름,겉죽한 오줌	요도염	tm 대혁,곡골,중극,대장유,소장유,차료,삼음교하1촌 , 호전되지않으면 여자는 회음, 남자는 요도후면 cm 조해,삼음교,중극,곡골,경골
두통,편두통,현훈,시력몽롱,이명,기면,불면증,식욕부진,오심,구토증, 발작,진땀,숨쉴때 오줌냄새	요독증	삼리,곡지,천료,고황,간유,비유,신유,지실,중완,수분,음교,중극,수도
	요복신경통	삼리,중완,천추,중극,신유,대장유,양관,차료,포황,충문, 기문,삼음교
	요통	삼리,곡지,중완,천추,신유,대장유,양관,요유,폐유,간유, 상차료,삼음교,양관(급성의 경우)

장기간 자리에 누워 지내는 사람에게 특히 잘 생긴다. 몸이 침대와 침구에 오랫동안 눌리거나 쏠려 혈액순환에 장애가 와서 생긴다. 욕창은 팔꿈치·엉덩이·골반 등과 같이 뼈가 튀어 나온 부위에 더욱 생기기 쉽다. 욕창을 예방하고 치료하기 위해서는 누워 있는 사람의 자세를 자주 바꿔 주고, 매일 목욕 시키며, 욕창이 생긴 부위는 국소적 처치를 해야 한다.	욕창	욕창이 심한 부위에 뜸
원인없이 둥글게 빠지는 증상	원형탈모증	tm 무극 + 신유, 탈모부위 중심에 쌀알크기로 9장정 도 1회만 하면 머리카기 시작함
희발월경이란? 월경주기가 35일 이상~3달 안에 월경하는것임 과소월경이란? 월경주기에는 이상 없으나 월경 량이 매우 적은 것을 말함(보통20~30ml)	월경 (희발/과소)	tm 천료,간유,신유,차료,관원,대혁,혈해,삼음교,백회 cm 병행
무월경이란?18살이 지났어도 월경이 없거나(원발성무월경) 월경을 하던 여자가 월경이 없는것(속발성무월경)을 말한다. 침뜸의학은 경폐, 또는 폐경 이라고도 한다	월경(무월경)	아주약한 사람 제외하고는 뜸해주면 생리가 잘나옴 tm 천료,간유,신유,차료,대혁,혈해,삼음교,백회 cm 병행
월경때 갑자기 화를 내며 크게 다투다 쓰러진 경우. 신음이 부족한데다 크게 성을내어 간을 손상시켜 쓰러졌으니 간경 을 사혈하면 깨어날것임	월경(월경때문에 생기는 탈)	cm 대돈
월경직전이나 시작때부터 월경하는 전 기간에 심한 하복통,요통,불 쾌감등이 나타나는 증후군 침뜸의학적으로는 통경,경통,월신통등	월경곤란	미혼은 중극,수도 만 뜸해도 효과있다. ,부족하면 삼음교추가, 그래도 낫지않으면 조해추가 tm 축빈,삼음교,조해,간유,신유,상료 cm 병행, 삼음교가 요혈이다
월경주기는 정상이나 월경때마다 나오는 혈액량이 정상보다 많음 과다월경 또는 경수과다 라고 한다	월경과다	아주약한 사람 제외하고는 뜸해주면 생리가 잘나옴 tm 천료,간유,신유,차료,대혁,혈해,삼음교,백회 cm 병행 *무월경과 동일 치료*
신허가근원 그리고 심도 약하다 . 젖가슴이 유난히 아프거나 온몸이 붓고 체중이 늘	월경통(월경전증후군)	tm 무극보양, 삼음교, 신유, 천추 cm 병행
명치아래에 생기는 갑작스런 통증, 윗배의 심한 경련성통증, 통증은 식사와 관계없으며 메스꺼움 및 가슴에 쓰린감은 있으나 구 토증상은 거의 없음	위경련	tm 이내정 에 뜨거워질때까지 뜸 , 통증이 소멸되지 않으면 좌양구에 10~20장 , 지양,거결,중완,위유 3~5장 ,cm 사관, 소상 (사혈) *충수염,담석통,췌장염,장기생충에도극통감별잘할것
소식,위 팽만감,두들기면 탁음이 남,복부 팽만감,트름,구토는 안함	위근쇠약증	삼리,곡지,폐유,고황,지양,격유,간유,중완,거결,우활육 문,기해,관원,수분
위부위의 불쾌감,신티림,공복시에 위가 아픔을 느끼지만 무엇인가 먹으면 완화.	위산과다증	삼리,곡지,폐유,고황,지양,간유,담유,위창,중완,좌양문, 우활육문,수분,기해,거결
식후 통증,소화가 안되며,헛배가 부르고 답답,트림	위산과소증	삼리,곡지,폐유,고황,간유,비유,신문,거결,중완,좌양문, 우활육문,삼음교
,명치끝 통증은 기본 ,위궤양:식사후30~1시간후 ,십이지:식사후30~4시간후 및공복시 심한 통증 ,대변은 검은색,위 가 아픔과 동시에 토혈 또는 구토	위십이지장궤양	tm 지양,신유,위유,거결,좌양문,우활육문 , 간혹환자에따라 치료후 더심하다고 하는 경우도 있음, 이경우 복부의 치료점은 며칠간 쉬었다함 ,cm 위궤양오래되면, 위 주변 만져보면 아픈곳 촉진 됨 이 부위에 자침하면 통증 경감된다.
	위암	견외유,지양,비유,신유,좌양문,수분,우활육문
위 부위가 아프고 메스껍고 구토. 혈태,구취,설사,변비동반, 권태감	위염(급성)	tm 양문,거결,지양,비유,위창 cm 소상(기를통하게), 일반적으로 합곡,내정 , 설사하면 삼리,양구 메스꺼우면 중완,좌양문,거결 , 두통동반시 현로,현리,양백,두유 * 먼저 식중독
식욕감퇴,위 팽만감,구취,구갈,변비,설사,신경질적,불면증 동반 가능	위염(만성)	tm 격유,간유,비유,위유,좌양문,거결,우활육문 , 간과 관련있으면 간유 , 신과관련있으면 신유,관원,수도 cm 속이쓰릴경우 수분에 상사자(1.6촌자입) , 쓰린증상 금방 없어짐

토하지도 못하고 배설도 못한다	위장염(급성중독성위장염)	응급처치(사혈) ,- 십선, 위증
혈압항진, 심장비대, 야간 요량 증가, 주간 다뇨증	위축 신	삼리, 곡지, 폐유, 고향, 간유, 비유, 신유, 지실, 중완, 수분, 황유, 관원, 백회
명치끝팽만감, 아픔, 매스꺼움, 소화불량, 공복시에도 복부팽만감, 두통, 우울, 불면, 신경쇠약 동반 반듯하게 누우면 위통멎음	위하수증	tm 지양, 근축, 삼초유, 거귀, 수분, 우활육문, 음교, (삼리, 곡지, 폐유, 고향, 중완, 기해, 백회) cm 중완, 양문, 활육문, 천추, 지양, 격유, 비유, 위유 여성의경우 임신중에 저절로 낫는 경우 있음
위와 십이지장안의 가스와 내용물이 소장으로 내려가지 못하고 정체되면서 토하고, 기운없고, 탈수증상	위확장증(급성)	tm 지양, 격유, 간유, 거귀, 우활육문, 수분 (삼리, 곡지, 폐유, 고향, 중완, 기해, 관원) cm 격유, 간유, 중완, 좌양문, 천추, 양릉천
유뇨증이란? 잠든다음에 자기도 모르게 잠자리에서 소변보는것	유뇨	tm 5~10세어린이: 좌황유, 명문, , 10세이상어린이: 중완, 좌황유, 명문, 중극, 상료 , 15세이상: 삼리, 곡지, 신주, 간유, 신유, 명문 , 상료, 좌황유, 중극, 중완, 백회 cm
	유루	찬죽-->삼리, 곡지, 백회, 두임음, 천추, 풍지, 견외유, 대추, 폐유, 고향-->부인들의 경우(천중, 간유, 신유, 상료, 수도, 중극, 삼음교 추가)
	유선염	풍문
유정이란? 정액이 저절로 나오는것 정액이 꿈과함께 나오는것은 몽정, 깨어있을때 스스로 나오는것은 활정 또는 누정, 스변과 함께 나오는것은 유정이란 한다	유정	tm 태돈, 간유, 신유, 상료
	유주신	중완, 우황유, 음교, 상료, 명문, 신유, 좌지실, 근축, 삼리
	유집부족	잔중, 천료, 천중, 고향, 지양, 중완 ->그래도 안 나오면 삼리, 곡지, 신주, 백회 추가
성욕, 발기, 사정, 성적쾌감 가운데서 어느하나가이상 장애된것 음경이약해 잘 서지않는것, 남자의 교접불능, 사정불능, 정충 부재	음위	tm 간유, 신유, 지실, 황유, 음교, 수도 무극 여자는 삼음교 추가
	이관폐색	신회, 풍문, 완골, 예풍, 곡지
귀에서 소리나는것 대부분 허증에서음, 치료잘안됨	이명	cm 무극 + 완골 , 신허일때: 조해, 유부 추가 , 어지러울때: 두유 추가 tm 예풍에 심자 (필요시 철궁 추가)
귀에서 소리나는것 대부분 허증에서음, 치료잘안됨	이명	사혈(응급조치) , 상양, 중추
	이빨가는것(잠잘때)	cm 하관(심자)
	이통	예풍, 완골
이하선염 바이러스에 의해 이하선의 부종과 전조직들의 장애를 일으키는 급성호흡기성 어린이 전염병	이하선염	tm 소아의경우: 풍문에 다장구(15장정도) , 일회에 안들올때: 예풍, 풍문, 신주, 곡지 , 어른의경우
코가 막혀 입으로 호흡	인두편도선증식증	예풍, 백회, 견외유, 신주, 신유, 중완, 복류
오한발열, 두통, 담화곤란, 동통 풍문, 풍부에 20장, 천돌, 예풍 5장+	인후염	보통: 천돌, 중완, 태계, 예풍, 소상, 풍부, 풍문, 폐유, 고향 안될때: 풍부, 풍문 다장구
갑자기 기분이 나빠지고, 두통, 구역질, 눈에 충혈, 땀이 나지않고 피부가 건조, 맥박이 빨라지고, 체온 상승, 얼굴이 빨개지고, 의식 몽롱	일사병, 열사병	삼리, 곡지, 신주, 폐유, 신유, 백회, 풍문(열이 심할때), 거귀, 중완(구토가 있을때)

	임신부증	삼리,곡지,간유,신유,중완,축빈,삼음교,조해
임신초기에 나타나는 메스껍고, 토하는 증상	입덧(=임신오조)	tm 거궤에 뜬하면 대개는 치료되나 심하면 , 지양,삼초유 추가 치료가 미진하면: 신주,격유,위유,삼초유,차료, 양문,우활육문 + 무극
	임질	삼리,곡지,삼음교,폐유,고황,신유,양관,중완,음교,수도, 중극
고름이 흐름 콩알만한 크기인 대두로 뜸을 뜸	임질(급성)	tm 삼음교 1촌 아래 (대두로 뜸)
자궁에 생긴 양성인 활평근 섬유종을 말함	자궁근종	자궁근종이 중극과 곡궤 사이에서 좌우에서 3~4cm 부터 만져진다. Tm 수도,음교,천추 가 요혈 , 천료,간유,신유,차료,관원,대혈,혈해,삼음교 삼음교 중극 삼음교 관원 혈해
자궁 내막의 염증이 만성적으로 진행되면서 자궁경부 조직실질과 골반결합조직으로 퍼지는 병을 말한다 **증상 -.농성대하가 점차 흰색의 진득한 대하로 되고 양이 많다 , 하복통,요통,성교시의 통증.빈뇨,신경이 예민해짐	자궁내막염	tm 삼음교 하1촌 + 중극 ,만성: 삼리,곡지,신유,상료,요유,중완,음교, , 중극,삼음교
자궁에 생긴 상피성 악성종양으로서 점차 줄어드는 경향이 있지만 아직까지 여성성기 앞에서 발병률과 사망률이 높다. 봉루,대하의 범주에 속한다 **증상:부정출혈,대하,통증**	자궁암	완치목적이 아닌 고통을 덜어줄 목적으로 뜸한다
자궁의 기질적 질병없이 내분비장애에 의해 생기는 자궁내막으로 부터의 출혈을 말함	자궁출혈	tm 삼리,곡지,신유,상료,요유,중완,음교,중극,삼음교-- >출혈이 심하면 "태돈" 에 대장구
자궁전체가 질입구 밖으로 나오는 것. 자궁이 음부밖으로 나옴	자궁하수 (자궁탈출)	tm 견외유,간유,근축,명문,요유,상료,양지 , 삼리,곡지,중완,관원
	자궁후굴	삼리,곡지,견외유,천추,간유,근축,명문,요유,상료,중완, 양지,관원
	장단지(비장근파열)	근륜, 위중,승산 및 아시혈
	장산통	삼리,곡지,삼음교,중완,황유,기해,태거,소장유,신유,지 실
구토,복통,배가 끓음과 동시에 설사	장염(급성)	삼리,곡지,대장유,격유,중완,천추,기해,중극,신유. (심한경우 이내정)
복부 불쾌감,패안감,변비,설사,신경과민,두통,어지러움,불면증,가슴 답답,트립이 자주 나옴	장염(만성)	삼리,곡지,신유,대장유,중극,수도,천추,기해,중완,좌양 문,거궤
	장하수증	삼리,곡지,소장유,대장유,관원,기해,천추,중완
	저혈압	tm 격유,간유,신유,천추 , 삼리,곡지,백회, 폐유,고황, 중완, 관원
전립샘증식증이란? 전립샘이 커지는 것 제1기 : 회음부불쾌감,회음부압박감,빈뇨등 특히 밤에 배변회수가 많아지며,소변이 가늘고 분출력이 약하다 제2기: 50~150ml정도의 잔료,배뇨곤란이 심해진다. 제3기: 300ml이상의 잔료가 있어도 고통 못느낌,빈뇨만있을수있음	전립샘증식증	tm 삼음교,삼리,신유,명문,중료,시해,중극,수도,곡궤 , 때로는 중극에 대장 ==>속히완쾌되기도함 cm 중극과곡궤 중간에 심자 : 전음부까지 짜릿하고 기가 간다고 하며 5분가량 유침,삼음교,수도 **병이깊지않은데도 침감 없다면 발침후 다시자침
오줌이 나올때까지 시간이 많이 걸림,오줌에 힘이 없어 발등에 떨어 질정도,밤에 오줌이 잦다.잔뇨가 많다	전립선 비대	삼음교,삼리,신유,명문,중료,기해,중극,수도,곡궤
오줌이 나올때까지 시간이 많이 걸림,오줌에 힘이 없어 발등에 떨어 질정도,밤에 오줌이 잦다.잔뇨가 많다	전립선 비대	삼음교 (뜸), 곡궤~중극 (심자)
	전신절통	외관, 현종
불안상태:불안,가슴답답,호흡촉박,심계항진,어지럼증,한기, 손발저린감 또한 빠른맥,혈압상승,구갈,메스꺼움,구토,설사 빈뇨,식은땀,월경이상,성욕감퇴 등을 보는수도있다 신경 쇠약상태:피로감,집중력저하,불안,기억력감퇴,불면증,두통 심계항진,견비통,설사,눈꺼풀과손가락경련	정신신경증	tm 삼리,곡지,중완,관원,신회(백회주변),천추,신주,신 도,영대,심유,간유,신유,신문
	정액루	삼리,곡지,태돈,중완,곡궤,관원,고황,간유,신유,상료

화농성세균이 모낭침습. ※ 종기 : 응어리, 중심에 고름 주위에 심한통증 , 옹 : 엉덩이/등에 발병	종기 (절(癰), 옹(癰))	곡지,합곡,환부 **. 얼굴에 여드름 같이 많이 나는 경우에는 曲池와 슴슴에 30장~100장정도 뜨거울 때 까지 하고 예민 한 사람은 뜨거움을 모를 때 까지 한다. 하루 1회에 나 2회정도 한다.
모낭에 수싹개,노란고름	종기, 옹	곡지,합곡 뜸 (2개월이상)
종아리 안쪽이 저리고 뻘치듯 아픔 (요추3번하) 좌골신경이 어떤것으로부터 압박을 받거나 외상으로 상처입었을때	좌골신경통1	tm 2,3,4번요추하, 삼리,곡지,중완 cm 2,3,4번요추하, 삼리,곡지,중완, , 신유,포황,은문,승근
통증이 발등 엄지발가락 쪽에서 종아리앞 바깥쪽에 나타남	좌골신경통2	tm 3,4,5번요추하, 삼리,곡지,중완 cm 3,4,5번요추하, 삼리,곡지,중완, , 신유,포황,은문,승근
통증이 새끼발가락에서 종아리 바깥쪽으로 나타남	좌골신경통3	tm 4,5번요추하, 삼리,곡지,중완 cm 4,5번요추하, 삼리,곡지,중완, , 신유,포황,은문,승근
고막이 뚫어져 오랫동안 고름이 주기적으로 계속 나오면서 청력이 나바지는 증상 저시력+오형 2개월이내 고름그치	중이염	급성(예풍,완골,양노), 만성(무극 추가) cm 예풍(심자)
고름과 말간 진물이 섞여나옴	중이염(감기않고나서생긴 경우)	cm 예풍(깊게 심자)
	중풍	현증,양릉천,삼음교, 팔사혈,중저,양지,곡빈,백회,간유, 인중
중풍은 뇌졸중(腦卒中)이다. 1. 풍병은 몸안에서 조금씩 조금씩 천천히 온다. 2. 수족이 저리고, 엄지와 둘째손가락이 힘이 없어서 물건을 자주 떨어뜨린다. *중풍전조(前兆)증...앞으로 반신불수나 구안와사, 언어장애와 같 은 대풍이 든다는 신호다. 3. 습생담(濕生痰), 담생열(痰生熱), 열생풍(熱生風) *감기환자가 몸에 열이 심하여 차게 하였더니 중풍을 맞았다. 4. 오지(五志)가 지나치면 심화(心火)가 폭성(暴盛)한다. *기뻐하고 놀람이(喜驚) 지나치면 심장이 상하며.. *화를 냄이(怒) 지나치면 간이 상한다. *생각하고 걱정함이(思憂) 지나치면 비위가 상하고.. *슬퍼함이(悲) 지나치면 폐가 상하며.. *무서움이(恐) 지나치면 신장이 상한다. 5.등뼈 맨위 부위에 살이많고 툭 튀어 나온경우는 중풍이 올 확률 높으니 조심해야한다 6. 반신운동마비가 주증상,경우에 따라 언어불리,지각장애,마비증 노출중전구증은 고혈압이나 동맥경화증이 있는 사람들이 중풍을 맞기 직전에 겪는 증상 - 눈앞이 캄캄해지면서 가슴이 답답하다 - 뒷목이 뻐뻐해지면서 머리가 터질것 같다 - 속이 미식거리고 토할것 같다 - 손이 떨리고 몸이 떨리며 어지럽다 - 시력면,몸은 비틀거리면 중풍이다	중풍(=뇌졸중, 반신불수, 탄탄) 중풍7대 요혈 tm 백회,곡빈,견정,풍시,현중,족삼리,곡지,아시혈 , ,tm 무극 + 외상으로온경우는 다쳤던곳에 뜸 cm 뜸병행, 운동불리된쪽 환도,둔압,풍시에 자침	
쭈나는것 오랜시간 먼 거리를 걷거나 뛰는운동,수영으로 근육에 피로가 쌓이 거나 야간취침시 많이일어나며, 기지개를 하는 중에도 발생함	중풍(중풍맞기직전)=뇌졸 중전구증	응급처치(사혈) , 심선,이침,기단,설침
부어오른 장딴지가 돌덩이처럼 딱딱함, 비장근파열, 장딴지통통부음	쭈 (비복근경련)	급성: 승산에 다장구 만성: 신유,대장유,요양관,승근,승산,곤륜 에 뜸
증상없이경과하는경우 많음 때로는 식욕감퇴,피로감,헛배부르기,오른쪽옆구리의 가벼운통증 혹 은 압박감 등이 있다 비마침기나수양은 연약자에 다 1번 2회정도로 때에 새기다	쭈 장단지파열(비장근파 열)	cm 곤륜,위중,승산,아시혈(가장딱딱한곳)
직장출혈이 심하면 대변볼때 힘만 주어도 소변 나오는것처럼 피가 뿜어져 나옴	지방간	tm 지양,간유,담유,신유,거궐,우불용,우양문 , (삼리,곡지,중완, 관원)
	직장 출혈	tm 백회

	척수로	삼리,곡지,신주,영대,간유,신유,양관,삼음교,중완,중극
	척수염(급성)	삼리,곡지,폐유,고황,지양,간유,비유,신유,요양관,중완,기해,관원,중극
	척추과민증	백회,신주,폐유,고황,격유,지양,간유,근축,양능천,곡지,신도
척농증의 뿌리는 감기 , 비강내 염증 및 콧물, 코막힘 코가 답답하고 머리가 무겁기 때문에 집중력이 떨어짐 ==> 6개월 이상 뜸 : 위기 보혈	척농증 (부비강염)	cm 영향,비중격,인당,백회 +무극보양 tm 소아(폐유,신유,상성,중완) tm 어른(신유,상성,풍지)
	총수염	곡지,삼리,중완,천추,기해
소화흡수 저하, 만성위장병,호르몬분비이상으로 생감	체액 과소증	삼리,곡지,폐유,고황,비유,삼초유,소장유,기해,관원,우 활육문,중완,좌양문
열이나고 위의 아래쪽에 둔통 심한상복통(통증은 급격히생기는것 이 많으며,먹으면 더 심해지고,토해도 덜해지지않는다)메스꺼움,토 하기,복부팽만감,허리통증등 때로는 앞가슴,왼쪽어깨,잔등으로뻐 치며 아픔,심하면 쓰크에빠진다. 과음,과식등 식사섭생잘못으로 비위의부숙,운화기능 장애,비위의습 열이 간담에 영향을 주어생기며 기가울체되고 혈이몽쳐 생긴다. 신저우역주(기체역우주)	체장염(급성)	tm 견외유,비유,삼초유,위유,신유, 하완,우활육문 , 삼리,곡지,중완 cm 합곡,테충 (통증경감) , 격유,지양,간유,담유,비유
격심한 상복통 통증부위는 좌측상복부와 좌측어깨이고 심한경우 쇼크 한다 통증은 지속적이며,잔등에 방산하는경우 많다. 이밖에 복부팽만감,메스꺼움 과음(술,맥	체장염(만성)	tm 견외유,비유,삼초유,위유,신유, 하완,우활육문 , 삼리,곡지,중완 , 만성병이므로 뜸치료가 적당하다
항문주위에 현대 구멍에서 피고름 및 진물 나는것 항문주위 창상, 농양. ※ 항문주위 증기, 고름. 변통 시 동통, 화농	치루	tm 외치핵 , 삼리,곡지,중완,관원,대장유,백회 , 핵은있어도 통증이나 염증 발작은 없음 , 출혈 심할때 : 공최 (지혈됨) , 내치핵은 百會에 5장씩 2일 정도하면 대개 止血 된다. 계속 뜨면 좋아진다. tm 치핵 치료와 동일하나 , 아픔 부위와 양관,대장유가 요혈이다. , 치루는 누공주위에 뜸하는것이 효과적이다.
잇몸붓고 출혈 약간의 자극에도 피가 난다 치석,고름생긴다 역한냄새,	치조농루(치주염)	지양,간유,신유,예풍 총치가원인일때: 지창 과 승장에 유침
잇몸붓고 출혈 약간의 자극에도 피가 난다 치석,고름생긴다 역한냄새,	치주염	무극,지양,간유,예풍 총치가원인일때: 지창 과 승장에 유침
치질로 출혈이 될때	치질 출혈	tm 백회
치핵이란? 치질이다. 수치질, 암치질 로 분류 ,지장하단부및 항문부의 정맥층이 매듭모양으로 불어난것을 말함 ,항문 질병중 제일 많으며,특히 20~50세사이의 남자에게 많다 치정맥 총출혈은 거둬지는 복잡항진이 주된 원인. ※ 외치핵→ 항문부 겉에 있고, 남청색에 완두콩크기에서 호도크기. 내치핵→ 상직장 부위.	치질(=치핵)	tm 외치핵 , 삼리,곡지,중완,관원,대장유,백회 , 핵은있어도 통증이나 염증 발작은 없음 , 출혈 심할때 : 공최 (지혈됨) , 내치핵은 百會에 5장씩 2일 정도하면 대개 止血 된다. 계속 뜨면 좋아진다.
윗니 : 족양명위경 아랫니(하치통) 폐 대장경 치료	치통	tm 상치통 : 삼리,해계,예풍 , 하치통 : 합곡,곡지,예풍 , 전체치료로 폐유,지양,중완 cm 윗니: 삼리,해계,권료,화료(귀연),예풍)
	치통	응급조치(사혈) , 팔풍,상양,여태 사혈 상양 팔사 주출도 무방하다
백회,공최가 요혈,아시혈	치핵,치루	위기보혈,관원,백회,공최,대장유,환부뜸 주위 자침
	코골이	cm 하관(심자) , 상성,인당 (코에 이상 있을때)

코피는 대개 한쪽이 터지게 마련임	코피(갑자기코피흘릴때)	cm 극문(코피가 나는 코의 반대쪽 팔의 극문혈)
녹혈, 코피나는것	코피(녹혈)	대추에 5장뜸하고 지혈안되면 상성,폐유,천주,공최 cm 극문에 유침
증상: 양쪽이 엇바뀌가며 코가 막히고 콧물이 많이 나온다	코피(비출혈)	풍문,상성 , -->안나오면: 삼리,곡지,폐유,고황,신유,중완 cm 콧물이 심할경우 어제에 자침 ** 소아는 신주,폐유,신유,상성에 뜬** 비염의 특효혈은 상성에 뜬
맞거나 부딪쳐서 ※ 피하출혈, 붓거나 발열. 환부가 작으면 직접 그 위에 다장하고 큰 경우는 환부주위로 여러 곳을 뜨면 확실하게 효과가 난다.	타박증(=관절염좌)	타박 부위와 염좌 주위의 가장 아픈 곳 (사혈) tm 아시혈 cm 아시혈, , 부어있는경우 반사법으로 건측에 유침
소아는 백회, 성인은 전신치료	탈항	위기보혈,천추,백회,요양관,대장유,소장유
탈항이란? 직장점막이나 항문전층이 빠져나온것 .1도- 배변시 항문이 빠져나왔다가 저절로 들어감 .2도- 배변시 빠져나온 항문을 손으로 밀어 넣어야한다 .3도- 배변만아니라 기침,재채기,걸을때,은침들때 6~8cm나옴 .4도-일어서기만해도 나오고 손으로 밀어 상습변비, 만성하리, 방광. 요도. 전립선질환, 기관지염, 치질. ※ 항문탈, 항문직장탈, 직장탈, 여성에 많다.	탈항(=변홍)	tm 천추,대장유,소장유,양관, , 소아탈항의 경우(백회 or 양관만 해도 됨) cm 병행, 대장유,
환자에게 참으라 하고 질이 조금 낮은 파란색을 약간 단단하게 뭉쳐서 뜨겁게 떠주는 것이 요령이다. 제일 아파하는 자리에 땀을 떠주면 한번에 나올 수도 있다. 땀은 작게 하다가 차츰 키워가며 나중에는 완두콩 만하게 한다. 단 많이 뜨겁다고 할 때까지 한다	테니스엘보우(주관절통)	제일아픈곳에 뜬땀다. 땀은처음에 작게하다가 나중엔 완두콩만하게한다 연속구로하면 3장가지는 상당히 뜨거워하지만 그다음부터는 뜨거운것을 잘 모른다. 이후 15장을 연속구로 뜨면된다 반드시아무탈이없다는것을 미리 설명해준다 이경우 고름이 나와도 아무탈이없다. 사마귀,발뒤축통증,티눈과 같은방법으로한다 기장아파하는곳에 지치한다(?)
손발이 괴사되는 증상	특발성탈저	손(삼리,곡지,간유,비유,신유,양지,내관,아픈 손가락의조갑각) 발(삼리,곡지,중완,간유,비유,신유,대장유,양관,해계,신맥,조해,조갑각)
	티눈	직접 해당 부위 티눈크기로 단단하게 다장구 , 뜨겁다고 아우성하고 3장더하면됨
	편도비대증	소아(신주,풍문,지양,공최,중완) 성인(삼리,곡지,폐유,고황,신유,예풍,중완)
구개편도에 생긴 급성감염성염증	편도선염(편도염)	tm 조해,풍문,예풍 cm 침삼키기곤란하면 중층에 5분간 유침 감기가 원인이라면 대추,외관,소상,합곡,산양,관충, , 천용, 천유
결핵초기는 자각증상 없다 어느정도 진전되면 전신중독증상으로서 발열,전신권태감,자한,식욕감퇴,소화장애,체중감소 폐국소증상은 기침,가래,혈담있고 진행되면 호흡곤란과 각혈까지 환수안된다	폐결핵	tm 처음: 족삼리,곡지,폐유,격유,영대 , 추가: 신유,중완,거결,기해,관원
기본은 호흡곤란이고,기침,가래오랫동안 걸거나 계단오르면 숨이 가쁘고,가슴이 두근거림 오래되면 산소결핍 현상이 나타나 안색과 입술이 창백해진다	폐기종(폐에종기생김)	삼리,곡지,견정,폐유,고황,영대,심유,격유,중완,관원,신유
갑자기 오슬오슬츄고 떨리며,고열,기침,가래(or혈담),가슴아픔,숨이 차고 전신중독 증상.. 입술주위 수포진, 얼굴이달아오르는증상, 자남색, 병조부위에서 고 성탁음,뚝하는소리,수포음등이 들린다. 체온상승,기침,객담,호흡증가 및 곤란,맥박증가,피리소리,	폐렴	tm 전중, 풍문, 삼리,곡지,중완,폐유 처음감기로 열있을때:풍문 or 폐유 9~15장 급성기관지염 환자중에서도 맥박이 빠른 사람은 현재 심하게 앓고 있는 사람이며, 이때 열이나면 풍문에 뜬을 하여 땀을 많이 나게 한다.
반드시라 할 만큼 얼굴 피부가 까칠하면 목에 응어리가 있다. 확인해라	피부(얼굴피부가 까칠)	tm 폐유,신유,기해,관원 cm 삼리,곡지,중완,거결

여자들의 하혈은 땀을 뜨면 금새 멎는다	하혈	tm 대둔
배변시 심한 통증	항문균열	삼리,곡지,중완,황유,수도,신유,대장유,상료,이신문
주로 便秘가 원인. ※ 균열되면 배변 시 심한 통증, 치루가 생기기도.	항문균열	tm 育俞,水道,腎俞,大腸俞,上膠,裏神門
항문열창이란? 항문이행상피가 균열,미란,궤양형태로 찢어진것 . 3대 항문질환의 하나로 어린이와 여성에게 많다.	항문열창(치열,항렬)	tm 황유,수도,신유,대장유,상료,이신문 cm 고질적인 변비에 "장강"이 요혈일수 있다.
아침(만성기관지염,기관지확장증,부비감염), 저녁 및 잠자리들때(폐기종,폐수종), 야간또는 이른아침(기관지천식)	해수	폐기강화(폐유,고황), 천돌에 뜸 삼리,곡지,견정,폐유,고황,잔중,거골,중완,기해,(천돌)
허리빼끗	허리빼끗 허리염좌 (=관절염좌)	백환유 양쪽 서너군데 사혈 왼쪽 아프면 오른쪽,오른쪽 아프면 왼쪽 사혈
	허약체질(선병질)	8세이전(신주,신유,중완) 8세이후(폐유,고황,격유,신유,중완,활육문,관원)
갑자기 어지럽고 쓰러질것만 같다 천장이 빙빙돈다. 눈앞에 아찔하며 캄캄해진다	현훈(갑자기어지럽다)	사혈(응급조치) , 액문, 소충, 관충
앉거나 누워 있다가 일어나면 갑자기 어지러워 지는 증상. 심하면 서있기가 곤란하기도 하며 넘어지기도 한다. 하늘이 도는것 같거나 눈 앞이 캄캄해지는등 여러요인이 있다 요통,유정,홍민,불면,오심,구토,식욕감퇴등의 증상이 동반되기도한다	현훈(어지럼증)	tm 중완,백회,신주,격유,간유 (필요시 두유) cm 뜸과병행
처음과 끝에만 오줌에 피가 보이고,중간에는 붉은색오줌	혈뇨	삼리,곡지,폐유,고황,신유,중완,천추,중극,수도,삼음교
발작적인 가슴 아픔 가슴아픔은 심장을 조이는듯하며 짓누르면서 조이는듯한 아픔으로 갑자기생기며 3~5분(15분미만)정도 지속되다가 갑자기 멎는다 아픔은 왼쪽어깨,팔,왼쪽네번째와 다섯번째	협심증	tm 심유,지양,신유,,잔중,거골,신문 , 삼리,곡지,고황,백회,천주,중완,관원 cm 뜸병행
-협심증 전구증상 왼쪽 가슴을 누르는 듯한 느낌이 있다. , 왼쪽 어깨와 팔에 힘이 빠진다 , 가벼운 불안과 함께 전신에 힘이 빠진다. -협심증의 증상 , 갑자기 왼쪽가슴에 심한통증(쥐어짜는,바늘로 찌르는듯한) 통증이 심장->왼쪽어깨->왼쪽팔꿈치->왼쪽손까지 퍼진다 얼굴 창백해지고,식은땀흐르며, 하품하기도한다	협심증	응급조치(사혈) 수십이정혈 또는 중충,소충 사혈 , 증상이 가라앉지 않으면 족십이정혈,용천
	호흡곤란	삼리,곡지,폐유,고황,간유,신유,거골,중완
흉채에 염증 생긴것 시력장애, 눈 부시고 눈물나며, 야간에 눈에 통증 심해진다	흉채염	삼리,곡지,백회,대추,폐유,고황,간유,각손,중완
육구불만 같은걸로 기가 발산될수 없으면 가슴에 열기가 팽차오름	화병(마음이상해서오는내상병)	tm 풍문, 폐유,중완,곡지,삼리 cm 어제,통리
심장부아픔(또는불쾌감),가슴두근거림,숨가쁨,불안,공포감,무력감, 어지럼증,불면증,수족냉증,자한,소화장애증상,신경질등이다. 맥 박,혈압,정진상,심전도상 아무런이상없음	화병(심장신경증)	tm 천주,백회,심유,간유,신유,신문,잔중,천추 , 삼리,곡지,중완 cm 뜸병행
	화상	cm 아시혈, 풍문,폐유,축빈,혈해,외관
양황, 음황, 허황, 급황, 역려발황	황달	tm 우肩井,지양,담유,비유,신유,우불용,우활육문 , (삼리,곡지,중완,관원) cm 대둔,코밑(인중 위),은교에 사혈하고, , 우양문, 우불용, 활육분,간유,담유,신유 에 유치

<p>황달은 간의 기능에 이상이 왔을때 피부나 눈자위가 누렇게 변색되는 증상... 즉 간에 병이 들면 황달이 나타난다</p> <ul style="list-style-type: none"> - 온몸과 눈의 흰자위 부분이 누런빛 - 고열과 함께 갈증 - 가슴 밑의 배가 부풀어오른다 - 의식이 몽롱하고 헛소리를 한다 	<p>황달(급성)</p>	<p>응급처치(사혈) 수십이정혈, 은교</p>
	<p>후각감퇴,무후각</p>	<p>상성,천주 --> 신경파괴경우(삼리,곡지,상성,신회,천주,폐유,비유,중완)</p>
<p>후두부와 목덜미부위에 격심한 통증이 짧은 시간에 나타나거나 어깨로 방산한다 심한경우에는 두전,안와에 까지 방산하는데 지속시간은 각이하며 멎었다 더해졌다 한다</p> <p>통증이 심하면 항운동 방어목적으로 곧은 목자세를 취한다</p> <p>압통점은 유양돌기와 1경추를 연결하는 중간점,홍쇄유양근의 시작점 뒤 3경추 횡돌기부의 두에서 자주 나타난다</p>	<p>후두신경통</p>	<p>신주,풍문,천주,대추,삼리,곡지</p>
<p>헛소리,기침,후두부작열</p>	<p>후두염(급성)</p>	<p>보통: 천돌,중완,태계,예풍,소상,풍부,풍문,폐유,고황 안될때: 풍부,풍문 다장구</p>
<p>성대를 중심으로 한 후두점막의 급성염증 목이쉬고 기침이 발작적으로 나며, 목안이 좁아지는 감이 있고,소리를 낼때 몹시 아프다</p>	<p>후두염(만성)</p>	<p>tm 예풍,견정,비유 + 무극 cm 염천,천돌</p>
<p>성대를 중심으로 한 후두점막의 급성염증 목이쉬고 기침이 발작적으로 나며, 목안이 좁아지는 감이 있고,소리를 낼때 몹시 아프다</p>	<p>후두염(만성)</p>	<p>위기보혈, 예풍, 견정,폐유,간유,비유/염천에 반미립3장유효</p>
<p>앞뒤 늑골사이 찌르는 통증 모든든 흉통은 천중 과 전중 극효</p>	<p>흉통</p>	<p>tm 천중,잔중 cm 늑골 골절시 늑골 부러진곳 양릉천,현중,반대측 극문 유침</p>
	<p>히스테리</p>	<p>삼리,곡지,중완,관원,신회,천주,신주,신도,영대,심유,간유,신유,신문</p>

